

Klit [Klis] (*Arctium*)

<i>Arctium</i>	Bosklit (<i>A. nemorosum</i>)	Kleine klit (<i>A. minus</i>)	Middelste klit (<i>A. pubens</i>)	Grote klit (<i>A. lappa</i>)	Donzige klit (<i>A. tomentosum</i>)
bloemen	tros	tros	tros	scherm	scherm
steel rozetbladen				gevuld	gevuld of hol
bloemkroon	niet boven omwindsel uitstekend			niet boven omwindsel uitstekend	boven omwindsel uitstekend
bloemkroon	kaal			lila kaal	roodpaars, met meercellige haren
binnenste omwindselbladen					nabij top sterk paars gekleurd; plotseling versmallend in gekromde top
hoofdje	> 3 cm, zittend aan lange, boogvormig overhangende takken	15 -22 mm kort gesteeld of vrijwel zittend	20 - 30 mm 12 - 15 cm lange steel	grasgroen kaal	donker paarsgroen wollig
omwindselblaadjes	breder dan 1,7 mm lange stijltop				

Opmerking :

Voor het onderscheid tussen de Kleine (*Arctium minus*) en de Middelste klit (*A. pubens*) kan geen eenduidige combinatie van kenmerken gevonden worden. De conclusie moet dan ook luiden dat Kleine en Middelste klit twee namen voor één, zeer variabele soort zijn. De Vlaamse Plantenatlas voegt beide (onder)soorten samen.

Bosklit (*Arctium nemorosum*)

Familie

composietenfamilie (*Asteraceae*)

Diagnostische kenmerken

Basale deel van de middelste omwindselbladen (1,6-)1,7-2,5 mm breed. Hoofdjes van het eindstandige deel van de bloeiwijze 2,5-4 cm breed; alle hoofdjes aan het eind van de takken ongesteeld. Binnenste omwindselbladen 1-6 mm langer dan de bloemen. Bloemkroon kaal.



Hoogte bloeiende plant

100 – 200 (– 250) cm.

Bloeitijd

Augustus

Levensvorm

2-jarige rozethemikryptofyt (winterknoppen op of iets onder de grond)

Standplaats

Kapvlakten, open plaatsen in de bossen, bij voorkeur op kalkhoudende bodem



Verspreiding

		#wnm	# ex
●	... - 1970	0	0
●	1971-'94	3	3
●	1995 - ...	1	1



Kleine [Gewone] klit (*Arctium minus*)

Familie

composietenfamilie (*Asteraceae*)

Diagnostische kenmerken

Basale deel van de middelste omwindselbladen 0,6-1,6 mm breed.
Hoofdjes van het eindstandige deel van de bloeiwijze 1,5-3 cm breed, al of niet gesteeld.

Hoogte bloeiende plant

50 – 120 cm.

Bloeitijd

Juli - september

Levensvorm

2-jarige rozethemikryptofyt (winterknoppen op of iets onder de grond)


Standplaats

Wegkanten, woeste plaatsen, kapvlakten; nitrofiel.



Verspreiding

		#wnm	# ex
●	... - 1970	3	3
●	1971-'94	346	346
●	1995 - ...	119	119



Middelste klit (*Arctium pubens*)

Familie

composietenfamilie (*Asteraceae*)

Diagnostische kenmerken

Hoofdjes 20-30 mm breed, min of meer openstaand bij rijpheid, met tot 12 (-15) cm lange bloemsteeltjes.

Omwindsel duidelijk spinnenwebachtig behaard maar niet wollig.

Plant grijsgroen of geelgroen.

Hoogte bloeiende plant

60 – 120 cm.

Bloeitijd

Juli - september

Levensvorm

2-jarige rozethemikryptofyt (winterknoppen op of iets onder de grond)

Standplaats

Wegkanten, woeste plaatsen, geruderaliseerde duinen; nitrofiel.



Verspreiding

		#wnm	# ex
●	... - 1970	0	0
●	1971-'94	25	25
●	1995 - ...	11	11



Grote klit (*Arctium lappa*)

Familie

composietenfamilie (*Asteraceae*)

Diagnostische kenmerken

Bladsteel van de rozetbladen aan de voet met merg gevuld.

Hoofdjes tuilvormig gerangschikt, vrij kort tot lang gesteeld, 3-4,5 cm breed, kaal tot iets behaard.

Omwindselbladen heldergroen, zelden iets paars aangelopen. Binnenste omwindselbladen (0-)1-5 mm langer dan de bloemen.

Bloemkroon kaal of soms aan de top met korte klierharen.

Hoogte bloeiende plant

80 – 160 (– 200) cm.

Bloeitijd

Juli - augustus

Levensvorm

2-jarige rozethemikryptofyt (winterknoppen op of iets onder de grond)

Standplaats

Wegkanten en oevers, kapvlakten, vochtig ruderaal terrein; nitrofiel.



Verspreiding

		#wnm	# ex
●	... - 1970	0	0
●	1971-'94	32	32
●	1995 - ...	83	83



Donzige klit (*Arctium tomentosum*)

Familie

composietenfamilie (*Asteraceae*)

Diagnostische kenmerken

Binnenste omwindselbladen lintvormig, aan de top 0,75-1 mm breed en afgeknot of zelden kort toegespitst.

Hoofdjes tuilvormig gerangschikt, vrij kort tot lang gesteeld, 2-4 cm breed, bijna kaal tot zeer dicht spinnenwebachtig behaard.

Omwindselbladen aan de top vaak rood aangelopen. Binnenste omwindselbladen (0-)0,5-3,5 mm korter dan de bloemen.

Bloemkroon vrij dicht bezet met korte klierharen.

Hoogte bloeiende plant

50 – 100 cm.

Bloeitijd

Juli - september

Levensvorm

2-jarige rozethemikryptofyt (winterknoppen op of iets onder de grond)

Standplaats

Wegkanten, stortplaatsen, oevers; nitrofiel.



Verspreiding

		#wnm	# ex
●	... - 1970	0	0
●	1971-'94	0	0
●	1995 - ...	1	1

